



VALPROATE DE SODIUM ET DERIVES

(DEPAKOTE[®], DEPAMIDE[®])

THYMOREGULATEUR

Divalproate de sodium : **Comprimés gastro-résistants** à 250 mg et 500 mg
Valpromide : **Comprimés pelliculés gastro-résistants** à 300 mg

QUEL BENEFICE ATTENDRE DE CE MEDICAMENT ?



Ce médicament appartient à la classe pharmacologique des thymorégulateurs. Il est indiqué dans le traitement des troubles bipolaires.

Le trouble bipolaire autrefois appelé Psychose Maniaco-Dépressive (PMD) est un trouble de l'humeur. Il se caractérise par une variation anormale de l'humeur avec une alternance de période d'exaltation (épisode maniaque) et de fléchissement de l'humeur (épisode dépressif) entrecoupés par une période de stabilité. Les médicaments thymorégulateurs sont indiqués dans le traitement et/ou la prévention des troubles bipolaires. Ils corrigent les variations de l'humeur en les ramenant dans la normale, réduisant ainsi la souffrance psychique associée. Certains thymorégulateurs ont une activité préférentielle sur la phase maniaque et d'autres sur la phase dépressive.

En général, ils doivent être prescrits au long cours.

COMMENT PRENDRE VOTRE MEDICAMENT ?



Il doit être pris chaque jour, à heure régulière, en respectant la posologie prescrite sur votre ordonnance. Vérifiez bien le dosage des comprimés que vous prescrit votre médecin.

Avalez les comprimés avec un grand verre d'eau, sans les croquer ni les écraser, pendant ou en dehors des repas, en position assise ou debout.

En cas d'oubli d'une prise : Si le retard est de moins de deux heures prendre immédiatement le médicament. Au-delà de deux heures, sauter la prise et prendre la quantité prescrite la fois suivante. Ne doublez jamais les doses pour compenser l'oubli d'une prise.

QUELS EFFETS INDESIRABLES PEUVENT APPARAÎTRE ?



Ces effets indésirables peuvent ne jamais apparaître et sont différents d'une personne à l'autre.

Dans leur grande majorité, ils ne sont pas graves. Certains régressent, dès les premières semaines du traitement. Il faut les connaître pour pouvoir les identifier ou les éviter et, dans tous les cas, en parler à votre médecin qui recherchera une solution pour les atténuer, voire les faire disparaître.

Effets	Que dois-je faire ?
Nausées, vomissements	Prenez de préférence votre médicament au milieu d'un repas. Ces symptômes diminuent avec le temps, s'ils persistent, demandez l'avis de votre médecin ou pharmacien.
Diarrhées	Mangez du riz, des bananes, des carottes. Evitez les fruits crus et les produits laitiers. Buvez suffisamment d'eau pour vous réhydrater. Prenez votre médicament au cours du repas. Si les symptômes persistent, parlez-en à votre médecin.
Fatigue, tremblements	Parlez-en à votre médecin.
Somnolence	Evitez de conduire ou d'utiliser des machines qui pourraient s'avérer dangereuses.
Augmentation de l'appétit, prise de poids	Une augmentation de l'appétit peut apparaître dès le début du traitement. Ceci nécessite une surveillance régulière du poids. Evitez les sucreries (bonbons, gâteaux, viennoiseries, boissons sucrées). Réduisez les graisses. Pratiquez une activité physique adaptée.
Troubles de l'audition	Parlez-en à votre médecin.
Eruptions cutanées	Consultez immédiatement votre médecin.
Chute des cheveux	Cet effet est passager. Il peut dépendre de la dose de médicament. Parlez-en à votre médecin.

Cette fiche fait mention des effets indésirables les plus souvent rencontrés par les patients ; d'autres effets plus rares peuvent parfois apparaître ; parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien.

QUE SURVEILLER PENDANT LE TRAITEMENT ?



Hygiène de vie : Evitez les situations répétées de manque de sommeil et la consommation d'excitants : café, thé, cola, drogues.

Le poids : Une prise de poids supérieure à 5 kg après 3 mois de traitement nécessite une consultation diététique.

Prélèvements de sang : Votre médecin vous a prescrit des prises de sang régulières pour contrôler le bon fonctionnement de votre foie et la présence de globules blancs, globules rouges et plaquettes en quantité suffisante dans votre sang. Il peut aussi avoir prescrit des prises de sang pour contrôler l'efficacité du traitement, qui dépend de la quantité de médicament trouvée dans le sang. Ces analyses doivent être faites toujours à la même heure (le matin avant de prendre le médicament) et si possible par le même laboratoire.

Les signes d'alerte : Devant l'apparition d'un malaise inhabituel (avec nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit), d'une douleur abdominale sévère, de petits saignements inhabituels (gencives, nez) ou une tendance à avoir des bleus sur le corps, consultez votre médecin.

QUELLES PRECAUTIONS A OBSERVER ?



L'alcool : La prise d'alcool est contre indiquée, surtout en début de traitement, car elle peut entraîner une somnolence excessive, augmenter les effets indésirables, le mal-être et l'angoisse. Par la suite, une consommation très modérée est possible. Parlez-en avec votre médecin.

Les drogues : La consommation de ces produits peut favoriser une réapparition des troubles liés à votre maladie, de plus elle s'oppose à la réussite de votre traitement.

Les médicaments : Ne prenez pas de médicaments non prescrits par votre médecin. Demandez l'avis de votre médecin ou pharmacien car ce médicament peut présenter des interactions avec d'autres médicaments courants.

Ne pas prendre de médicaments à base de plantes sans demander conseil à votre médecin/pharmacien.

Conduite de véhicule : Soyez très prudent : ne conduisez pas sans l'avis d'un professionnel de santé.

Pour les filles et femmes en âge d'avoir des enfants - Projet de grossesse : La prise de valproate de sodium et dérivés pendant la grossesse entraîne un risque important de malformations et de troubles graves du développement qui peuvent se révéler lourdement handicapant pour l'enfant à naître.

Aussi, si vous êtes une femme en âge de procréer, vous devez utiliser une contraception efficace pendant votre traitement.

Si vous envisagez une grossesse, vous devez en discuter avec votre médecin spécialiste qui devra tout mettre en œuvre pour : soit stopper progressivement ce traitement, soit vous prescrire un autre médicament avant que vous n'essayiez de concevoir.

N'arrêtez pas votre contraception de vous-même.

LA REGULARITE DU TRAITEMENT



La prise régulière du traitement conditionne son efficacité qui apparaît après quelques semaines. Vous pouvez préparer un semainier pour ne pas oublier de prendre votre traitement.

La poursuite du traitement est indispensable pour obtenir une stabilité psychique. **L'arrêt du traitement** doit toujours être décidé en accord avec votre médecin prescripteur.

Conditions de prescription et de délivrance

Pour les femmes en âge d'avoir des enfants : une prescription annuelle par le psychiatre est obligatoire. Le renouvellement peut être fait par tout médecin.

La prescription annuelle par le psychiatre nécessite le recueil d'un accord de soins de la patiente.

L'accord de soins doit être présenté à votre pharmacien pour la délivrance du médicament.

Cette fiche d'information a été réalisée par les professionnels de santé du **Réseau P.I.C. (Psychiatrie - Information - Communication)**.

Toutefois, cette fiche est un support d'information non exhaustif qui doit vous permettre d'en parler plus largement avec votre médecin ou pharmacien. Vous pouvez également consulter la fiche plus détaillée sur le site reseau-pic.info