



HYDROXYZINE

HYDROXYZINE®, ATARAX®

ANXIOLYTIQUE

FAMILLE ANTIHISTAMINIQUE

Comprimé pelliculé sécable à 25mg

Sirop : Flacon de 200 ml, avec seringue pour administration orale graduée de 0.25 ml en 0.25 ml

QUEL BÉNÉFICE ATTENDRE DE CE MÉDICAMENT ?



Hydroxyzine est un médicament anti-histaminique utilisé pour ses propriétés anxiolytiques pour traiter les manifestations mineures de l'anxiété ou parfois en prémédication dans le cadre d'une anesthésie générale. Il peut également être utilisé dans le traitement de l'urticaire. La forme sirop est adaptée à l'enfant de moins de 6 ans.

Les anxiolytiques (appelés aussi tranquillisants) sont des médicaments utilisés pour soulager la tension nerveuse ou d'autres manifestations d'angoisse. Ces médicaments ne guérissent pas l'anxiété, sorte d'inquiétude exagérée qui apparaît dans notre vie quotidienne, mais en allègent les symptômes comme les sensations de poids sur la poitrine, d'étouffement, de gorge serrée, les palpitations, l'irritabilité, certains tremblements, la transpiration excessive, l'insomnie, etc... De ce fait, le traitement au moyen d'un anxiolytique ne constitue qu'un traitement d'appoint dont la durée doit être limitée (quelques semaines) et réévaluée car il existe un risque d'accoutumance. De plus, l'usage d'un anxiolytique doit être associé à un soutien psychologique ou éventuellement à un autre traitement médicamenteux (antidépresseur).

Le médicament occupe une place importante dans votre démarche de soins : il doit conduire à diminuer progressivement les symptômes liés à la maladie et vous aider à renforcer vos relations et vos activités. Mais le médicament à lui seul n'est pas totalement suffisant pour votre rétablissement. Il est très souvent nécessaire d'être soutenu par un accompagnement psychologique et de poursuivre des activités de votre choix (loisir, lecture, activités culturelles, etc).

COMMENT PRENDRE VOTRE MÉDICAMENT ?



Il doit être pris en respectant la posologie prescrite sur votre ordonnance. Vérifiez bien le dosage des comprimés que vous a prescrits votre médecin. Avalez les comprimés avec un grand verre d'eau, sans les croquer. La quantité de sirop sera mesurée avec la seringue graduée en ml, prévue pour une administration orale. Il est important de préparer un médicament avec son compte-gouttes approprié.

Que faire en cas d'oubli d'une prise :

Si le retard est de moins de deux heures prenez immédiatement le médicament. Au-delà de deux heures, sautez la prise et prenez la quantité prescrite la fois suivante. Ne doublez jamais les doses pour compenser l'oubli d'une prise.

QUELS EFFETS INDESIRABLES PEUVENT APPARAÎTRE ?



Ces effets indésirables peuvent ne jamais apparaître et sont différents d'une personne à l'autre. Dans leur grande majorité, ils ne sont pas graves. Certains régressent, dès les premières semaines du traitement. Il faut les connaître pour pouvoir les identifier ou les éviter et, dans tous les cas, parlez-en à votre médecin qui recherchera une solution pour les atténuer, voire les faire disparaître.

Effets	Que dois-je faire ?
Somnolence, fatigue, difficultés de concentration.	Parlez-en à votre médecin qui pourra éventuellement réévaluer les doses et leur répartition dans la journée. Soyez prudent dans les situations qui nécessitent de l'attention.

Effets	Que dois-je faire ?
Bouche sèche	Buvez souvent un peu d'eau. Mâchez une gomme sans sucre afin de stimuler la salivation. Vous pouvez vaporiser un spray de salive artificielle. Ayez une bonne hygiène dentaire.
Constipation	Favorisez les aliments contenant des fibres (fruits crus, légumes verts). Pratiquez une activité physique adaptée (marche...). Buvez suffisamment d'eau, en particulier le matin à jeun. Présentez-vous à la selle à heure régulière. En cas de douleurs abdominales et/ou persistance de la constipation, parlez-en à votre médecin.
Troubles de la vision : vision floue, difficulté pour lire.	Evitez de conduire. Ces symptômes diminuent habituellement avec le temps. S'ils persistent, parlez-en à votre médecin.

Cette fiche fait mention des effets indésirables les plus souvent rencontrés par les patients ; d'autres effets plus rares peuvent parfois apparaître ; parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien.

QUE SURVEILLER PENDANT LE TRAITEMENT ?



Hygiène de vie

Faites une activité physique dans la journée, ou au moins un peu de marche ou bien participez à des activités telles que la relaxation, le yoga, la sophrologie ou toute autre activité pouvant vous aider à vous relaxer. Evitez les situations répétées de manque de sommeil et la consommation d'excitants : café, thé, cola, drogue.

Les signes d'alerte

Prévenez immédiatement votre médecin en cas d'apparition d'une somnolence excessive ou de reprise de l'anxiété ou devant tout symptôme d'origine cardiaque.

QUELLES PRECAUTIONS A OBSERVER ?



L'alcool

La prise d'alcool est contre indiquée, surtout en début de traitement, car elle peut entraîner une somnolence excessive, augmenter les effets indésirables, le mal-être et l'anxiété.

Les drogues

La consommation de ces produits peut favoriser une réapparition des troubles liés à votre maladie, de plus elle s'oppose à la réussite de votre traitement.

Les médicaments

Ne prenez pas de médicaments non prescrits par votre médecin. Demandez l'avis de votre médecin ou pharmacien car ce médicament peut présenter des interactions avec d'autres médicaments courants.

La conduite de véhicules et l'utilisation de machines

Soyez très prudent : ne conduisez pas sans l'avis d'un professionnel de santé.

Projet de grossesse

Si vous envisagez une grossesse, parlez-en avec votre médecin. Lui seul sera à même d'évaluer la poursuite du traitement.

LA REGULARITE DU TRAITEMENT



L'arrêt du traitement doit toujours être décidé en accord avec votre médecin prescripteur. Il doit être progressif sur plusieurs semaines, sauf si le traitement a été de courte durée.