

## Introduction



Avant août 2020, la prazosine 1mg à libération immédiate (LI), **anti-hypertenseur** alpha-1 bloquant, était utilisée dans l'état de stress post-traumatique (ESPT) **hors autorisation de mise sur le marché (AMM)**.



**Août 2020 :**  
Arrêt de commercialisation de la prazosine **1mg LI**.



Swich vers la prazosine **2,5mg** à **libération prolongée** qui diffère d'un point de vue galénique de la forme LI par sa **matrice osmotique**.



Quelle posologie ?

Il n'existe **aucune recommandation** lors d'un changement de la forme LI 1mg à la forme LP 2,5mg.

## Matériel et méthodes



Etude rétrospective de **45 patients** réalisée au sein de notre EPSM d'une capacité de **429 patients**, du **1<sup>er</sup> février au 31 mars 2021**.





Analyse des prescriptions de **prazosine LP 2,5mg** et des dossiers patients informatisés (DPI) à partir des logiciels **Pharma®** et **Crossway®**.


Informations recueillies :

- Indication
- Posologie
- Modalités d'administration
- Surveillance tensionnelle
- Efficacité

## Résultats-Discussion




Population




Toujours prescrit en une seule prise par jour, le soir

Posologie




Modalités d'administration



Surveillance tensionnelle



Indication



Efficacité

## Conclusion

- Au sein de notre EPSM de **429 patients**, nous retrouvons **45 prescriptions** de prazosine LP 2,5mg, **hors AMM**, sur une durée de 2 mois.
  - De plus la surveillance tensionnelle n'est réalisée que dans **29%** des cas alors que les **posologies sont plus ou moins variables** et que la **forme galénique diffère par sa matrice osmotique** depuis août 2020.
  - Compte tenu du faible nombre de patients pour lequel l'efficacité a été tracée dans le dossier patient informatisé (DPI), il n'est pas pertinent de discuter d'un éventuel lien entre posologie / forme galénique et efficacité.
- Ainsi nous allons demander **systématiquement un traçage de la surveillance tensionnelle et de l'efficacité dans le DPI**.
- Il est primordial de définir de nouvelles recommandations de façon à sécuriser et harmoniser les prescriptions de la prazosine LP 2,5mg dans la prise en charge de l'ESTP.